



我孫子市公立保育園 令和8年8月発行

全国的に**麻疹（はしか）**の発生が続いています

1 症状

- ・感染すると通常 10日から 12 日後に 38℃前後の発熱、咳、鼻汁、くしゃみ、結膜充血などが約 2 日から 4 日間続き、解熱後、再び発熱し発疹が出現します。
- ・肺炎、中耳炎を合併しやすく、患者 1,000 人に 1 人の割合で脳炎が発症すると言われており、死亡する割合が高く、先進国でも 1,000 人に 1 人と言われています。

2 感染経路

- ・主な感染経路は、空気感染で、その感染力は非常に強く、免疫を持っていない人が感染するとほぼ 100%発症すると言われています。
- ・発症した人が周囲に感染させる期間（感染可能期間）は、症状が出現する 1 日前から解熱後 3 日間まで（全経過を通じて発熱がみられなかった場合、発疹出現後 5 日間まで）と言われています。

3 予防

- ・麻疹は、感染力が強く空気感染もするため、手洗いやマスクのみでの予防ができません。
- ・麻疹を予防するには、予防接種が有効です。
- ・麻疹に感染しない、広めないため、母子手帳などで予防接種歴を確認し、2 回接種していない方や予防接種歴が不明な方は、かかりつけ医などに相談し、接種を検討しましょう。

（松戸保健所感染症情報参照）

予防接種情報

麻疹風疹混合ワクチン（MR）

第Ⅰ期：1 歳から 2 歳の誕生日前日までが対象

第Ⅱ期：5 歳児クラス（年長）が対象

小学校入学前の 3/31 までに接種



手賀沼のうなぎちゃん
©我孫子市 2012